

**Klinické hodnocení veterinárního léčivého přípravku „Gabon Flum 4 mg proužky do úlu“
FORMULÁŘ pro záznamy sledovaných parametrů**

Odpovědná osoba za vyplnění formuláře (důvěrník ZO nebo OO, jednotlivec):

Jméno:

Kontaktní údaje (adresa, tel. e-mail):

Počet ošetřených včelstev:

Datum vložení „Gabonu Flum 4 mg proužky do úlu“ (dále Gabon Flum) proužky do úlu do včelstev:

Byl prováděn pravidelný monitoring přirozeného denního spadu roztočů v období před vložením Gabonu Flum?

ano ne

Při odpovědi **ano** uveďte nejvyšší zjištěné hodnoty:

u přirozeného spadu za 24 hodin

u oklepu práškovým cukrem ze 100 ml včel

Pozorovali jste po vložení Gabonu Flum větší rozrušení včel nebo jiné nepříznivé příznaky, např. větší agresivitu, souboje včel, opouštění úlu pod.? ano ne

Při odpovědi **ano** uveďte u kolika včelstev a popište podrobněji pozorované příznaky.

Pozorovali jste v průběhu nasazení Gabonu Flum větší neklid na včelnici, větší slídění nebo dokonce loupež?

ano ne

Při odpovědi **ano** popište jednotlivé případy podrobně:

Pozorovali jste při manipulaci s Gabonem Flum u sebe i při použití ochranných prostředků některé příznaky alergické reakce? ano ne

Při odpovědi **ano** popište své potíže podrobně:

Zjistili jste včelstva, ve kterých byl spad roztočů v prvních dvou dnech po vložení Gabonu Flum nižší než přirozený denní spad před vložením Gabonu Flum? ano ne

Při odpovědi **ano** uveďte u kolika včelstev:

Považujete spad roztočů v průběhu celé léčby za:

přiměřený aktuální nakažové situaci

nedostatečný

Při odpovědi **nedostatečný** rozveďte podrobně důvody, které vedly k tomuto závěru.

Datum odstranění Gabonu Flum ze včelstev:.....

Datum nejbližší následné fumigace Varidolem 125 mg/ml (říjen) po odstranění Gabonu Flum ze včelstev:

Spad roztočů po následné fumigaci Varidolem hodnotím jako:

u všech včelstev byl spad v rozmezí od 0 do 100

u většiny včelstev byl spad v desítkách u některých do 300

u většiny včelstev byl spad do 200, u některých 300 - 500

nepřiměřeně vysoký, u většiny včelstev nad 300 – 500.

Při odpovědi **nepřiměřeně vysoký** uveďte skutečnou průměrnou hodnotu zjištěného spadu roztočů po fumigaci a podrobné zdůvodnění nepřiměřenosti spadu po fumigaci.

Datum.....

Podpis.....,

Poznámka

Zvolenou odpověď označte křížkem ve čtverečku, který je umístěn před odpovědí. Pokud pro vlastní vysvětlení nebude ve formuláři dostatek místa, pokračujte na samostatném listu. Uvítáme i další vlastní poznatky a postřehy, které uvedete stejnou formou.